

# 服用ダイアリー

ヴァイトラックビ®の服用を始めた日から、服用状況や体調などをチェックして、毎日忘れずにダイアリーに記録しましょう。

気になる症状があった場合は、ダイアリーに記載して、必ず医師、看護師、薬剤師にご相談ください。

## 服用ダイアリーの使いかた

曆に合わせて日付を記入します

1回に服用するお薬の量を記入します

体温と体重を定期的に測定し、記入します

該当する症状がある場合は  を記入します

服用開始日		2021年 6月 1日(火曜日) [服用 1週目]													
日付(曜日)		6/1(火)		6/2(水)		6/3(木)		6/4(金)		6/5(土)		6/6(日)		6/7(月)	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1回服用量	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg (個)	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○									○						
体温		36.5 °C		36.5 °C		36.5 °C		36.5 °C		36.5 °C		°C		°C	
体重		65 kg		65 kg		65 kg		65 kg		65 kg		kg		kg	
全身の症状	めまい														
	体がだるい			✓		✓									
	さむけ・発熱														
消化器の症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
その他の症状	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
	手足のしびれや痛み														
運動機能	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
	筋肉痛														
その他の症状	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
発疹															
気になる症状があらわれた場合は、記載してください															

お薬の服用を始めてから何週目かを記入します

お薬を服用したら記入します (1回服用したら「1」に○、2回服用したら「2」に○)

病院を受診したら○を記入します

表の項目以外に気になる症状がある場合は、記入します

昨日より薬だが、だるさがある

服用開始日

年 月 日(曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状があらわれた場合は、記載してください															

服用開始日

年 月 日(曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状があらわれた場合は、記載してください															

服用開始日

年 月 日(曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状があらわれた場合は、記載してください															

服用開始日

年 月 日(曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
	筋肉痛														
その他の 症状	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状が あらわれた場合は、 記載してください															

服用開始日

年 月 日( 曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状が あらわれた場合は、 記載してください															

服用開始日

年 月 日(曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
	筋肉痛														
その他の 症状	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状があらわれた場合は、記載してください															

服用開始日

年 月 日( 曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状が あらわれた場合は、 記載してください															



服用開始日

年 月 日( 曜日)

[服用 週目]

日付(曜日)		/		/		/		/		/		/		/	
		(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
1日の服用タイミング		1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1 回 服 用 量	カプセル25mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	カプセル100mg ( 個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	内用液 ( mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診日に○															
体温		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C	
体重		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
全身の 症状	めまい														
	体がだるい														
	さむけ・発熱														
	むくみ														
	体重増加														
消化器の 症状	食欲がない														
	便秘														
	下痢														
	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
運動機能 の症状	手足のしびれや痛み														
	手足の動きがぎこちない														
	上手く歩けない														
その他の 症状	筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
	動悸・息切れ														
	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
	あおあざができる														
発疹															
気になる症状が あらわれた場合は、 記載してください															