

ヴァイトラックビ®を服用される 患者さんとご家族へ

はじめに

ヴァイトラックビ®は、NTRK融合遺伝子の存在が 確認された固形がん患者さんのためのお薬です。

この冊子では、ヴァイトラックビ®による治療を始め られる患者さんやご家族に、ヴァイトラックビ® のはたらき、服用のしかた、起こりやすい副作用と 対処方法などについて紹介しています。お薬の 服用を始める前に、必ずこの冊子をご覧ください。

お薬の服用にあたり、気になることや不安に思う ことがありましたら、遠慮せずに医師・看護師・ 薬剤師にご相談ください。

また、本冊子は常に携帯し、服用中に気になる 症状があらわれた場合は、その症状を本冊子 20ページから始まる「服用ダイアリー」にご記入 ください。また、病院を受診した際に医師などに 毎日の服用状況や体調をお伝えする場合にも 「服用ダイアリー」をご活用ください。

目次

ヴァイトラックビ®のはたらき	4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
ヴァイトラックビ®のはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
ヴァイトラックビ®の服用について	6
● 服用する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
●服用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
●服用時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
●保管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 11
ヴァイトラックビ®の副作用	12
ヴァイトラックビ®の副作用	12
ヴァイトラックビ®の副作用 服用ダイアリー	20
服用ダイアリー	20
服用ダイアリー ● 服用ダイアリーの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 ··· 20
服用ダイアリー ● 服用ダイアリーの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 ··· 20
服用ダイアリー ● 服用ダイアリーの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 ··· 20


ヴァイトラックビ®のはたらき

ヴァイトラックビ®のはたらき

NTRK 融合遺伝子とは

NTRK融合遺伝子は、がん細胞の増殖の原因となっています。


私達の体を構成しているさまざまな細胞が必要に応じて増殖し、十分な量になれば増殖を止めることができるのは、正常な遺伝子の情報を基に作られたタンパク質が正常に機能しているためです。ところが、がん細胞では遺伝子に変化が起き、異常なタンパク質が作られるため、がん細胞は増殖を続けます。NTRK遺伝子は細胞の機能や増殖に必要な遺伝子ですが、何らかの原因でNTRK遺伝子の一部と他の遺伝子の一部とが合わさり、異常な遺伝子であるNTRK融合遺伝子となる場合があります。このNTRK融合遺伝子から異常なタンパク質であるTRK融合タンパク質が作られると、がん細胞が増殖するための指令が出続ける状態となり、がん細胞は増殖を続けることになります。



ヴァイトラックビ®のはたらき

ヴァイトラックビ®は、NTRK融合遺伝子が原因となっているがん細胞の増殖を抑えます。

ヴァイトラックビ®は、*NTRK*融合遺伝子より作られたTRK融合タンパク質からの指令をブロックすることによって、がん細胞の増殖を抑えます。



ヴァイトラックビ®による治療の対象は、病状が悪化したり、がんが最初に見つかった体の部位とは別の臓器に転移した固形がん患者さんのうち、*NTRK*融合遺伝子の存在が確認された患者さんです。

ヴァイトラックビ®の服用について

ヴァイトラックビ®の服用について

服用する前に

以下の表に該当する方は、医師に必ずお伝えください。

肝機能障害のある方

● 肝臓の状態に応じて、ヴァイトラックビ®の用量を 調節することがあります。



妊婦または 妊娠の可能性がある方

医師が治療上の有益 性と危険性を十分に 検討した上で、投与を 決定します。





●妊娠可能な方は、ヴァ イトラックビ®服用中お よび服用終了後一定 期間は、適切な避妊を 行ってください。

授乳中の方

● ヴァイトラックビ®服用中は 授乳をしないことが望まし いとされています。



他のお薬やサプリメントなどを 服用中の方

- ヴァイトラックビ®の効果や副作用に影響をおよぼす ことがあります。
- 他のお薬やサプリメント「グレープフルーツやセイヨ ウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含有する 食品〕を服用していることを、医師、看護師、薬剤師 に必ず伝えてください。



MEMO

ヴァイトラックビ®の服用について


ヴァイトラックビ®の服用について

服用方法

ヴァイトラックビ®にはカプセルと内用液があり、 患者さんの状態などに合わせて医師が選びます。

ヴァイトラックビ®は1日2回服用し、1回に服用するお薬の量は次のとおりです。

	1回に服用するお薬の量										
dt 1	カプセルの場合 ・100mgカプセルを1個 または 25mgカプセルを4個										
成人	<mark>内用液の場合</mark> ・5mL										
小児	体表面積に合わせて医師が決定										



服用時の注意事項

医師から指示されたヴァイトラックビ®の量を 必ず守って服用してください。

- ●ご自身の服用量をご確認ください。
- 小児の場合、成長に伴い服用量が変わってきますので注意してください。
- ●医師から指示されたお薬の量を必ず守って服用してください。
- ●ご自身の判断でお薬の量を増やしたり、減らしたりしないでください。
- ●できるだけ毎日同じ時間に服用してください。

<カプセル>

- ●服用する直前にボトルから取り出してください。
- ●カプセルを開けたり、噛んだり、つぶしたりせずに、そのまま多めの水で服用してください。

<内用液>

- ●服用する直前に冷蔵庫から取り出してください。
- ●必ず専用のピペットで服用量をはかり服用してください。
- ●詳しい服用方法は説明書(ヴァイトラックビ®内用液の服用方法)を ご確認ください。

副作用があらわれた場合は、服用するお薬の量を減らすことや、 一旦お薬の服用をお休みすることがあります。その際は、医師の指示に従って服用してください。(ヴァイトラックビ®の副作用については、12~18ページをご参照ください)

ヴァイトラックビ®の服用について

ヴァイトラックビ®の服用について

服用時の注意事項

服用を忘れた場合、どうすればよいですか?

- ●忘れた分のお薬は服用せず、次の通常の服用 時間に1回分のお薬を服用してください。
- ●決して、一度に2回分のお薬を服用しないで ください。



ヴァイトラックビ®を保管する際は、 以下の注意事項を守って保管してください。

- ●お子様の手の届かないところに保管してください。
- ●本人以外が間違って飲まないように注意してください。
- ●お薬は決して他の方に渡さないでください。

<カプセル>

保管方法

●ボトルのまま室温で保管してください。

<内用液>

- ●温度管理が大切です。できるだけ室温 で放置せず、薬液ボトルは凍結を避け、 必ず冷蔵庫(2~8°C)で保管してくだ さい。
- ●使用中に著しい色の変化が生じた場合 は、変色したお薬は服用せず、医療機関 へお持ちください。
- 開封後30日を経過した場合は 服用しないでください。




多く服用した場合、どうすればよいですか?

●すみやかに、医師、看護師、薬剤師にご連絡 ください。お薬の副作用が強くなる場合がある ので、体調の変化に注意してください。

次のような副作用があらわれる場合があるため、 ヴァイトラックビ®服用中は体調の変化に注意してください。

体調がおかしいと感じたり、気になる症状があらわれた場合は、すみやか に医師・看護師・薬剤師にご連絡ください。



! ここにあげている副作用以外にも、「いつもと違う」と感じる症状がある場合は、すみやかに医師・看護師・薬剤師にご連絡ください。また、ヴァイトラックビ®と一緒に他のお薬を服用されている場合は、他のお薬の副作用があらわれる場合がありますので注意してください。

中枢神経系障害

主な症状

次のような症状があらわれる場合があります。



発現時期

服用を始めて3ヵ月以内にあらわれることが多いとされています。

服用中の注意事項

中枢神経系障害の副作用があらわれることがあるので、<u>自動車の運転、機械の操作等危険を伴う作業の際は自覚症状に十分注意を払ってください。少なく</u>とも投与開始から3ヵ月間は可能な限り危険を伴う作業を控えてください。

上記の症状があらわれた場合は、<u>すみやかに医師・看護師・</u> 薬剤師にご連絡ください。

肝機能障害

主な症状

次のような症状があらわれる場合は、肝臓の機能が低下している可能性があり、重症になるまで自分自身では症状に気付かないことがあります。 また、ALT増加、AST増加といった肝機能検査値の異常としてあらわれることもあります。



発現時期

服用を始めて3ヵ月以内にあらわれることが多いとされています。

服用中の注意事項

医師の指示に従って定期的に肝機能検査を受けてください。

骨髄抑制

主な症状

骨髄の大切な役割である血液細胞をつくる機能が低下したり、白血球や血小板などが減少することにより、次のような症状があらわれる場合があります。 また、白血球数減少、血小板数減少といった血液検査値の異常としてあらわれることもあります。



発現時期

服用を始めて3ヵ月以内にあらわれることが多いとされています。

服用中の注意事項

医師の指示に従って定期的な血液検査を受けてください。

上記の症状があらわれた場合は、すみやかに 医師・看護師・薬剤師にご連絡ください。

その他の副作用

疲労

症状

体がだるい、疲れやすいなどの症状があらわれる場合があります。

対処方法

疲労の原因が、副作用とは異なる場合もあります。体調に合わせて、日常生活と休息、睡眠のバランスを上手にとりましょう。

便秘

症状

便秘が起こる場合があります。便秘が続くとおなかが張ったり、吐き気や食欲低下につながることもあります。

対処方法

多くの場合、下剤などで対処します。下剤の処方は医師に相談しましょう。

筋肉痛

症状

筋肉の痛みがあらわれる場合があります。

下痢

症状

水分の多い便になり、トイレの回数が増える場合があります。

対処方法

- 食事がとれない場合でも、脱水症状を防ぐために水分をとるようにしましょう。
- 下痢止めや整腸剤など、お薬の処方は医師に相談しましょう。

むくみ

症状

手、足、顔などに起こりやすく、体重増加 がみられる場合があります。

対処方法

副作用とは異なり、日常的な「むくみ」の 場合があるので、定期的に体重を測る ようにしましょう。

体重増加

症状

体重が増加する場合があります (食事の量は増えていないのに体重が 増えてきた、急に体重が増えたなど)。



- ●症状の程度や状況を「服用ダイアリー」に記録しておき、
- 症状が気になる場合は、我慢せず、早めに相談してください。

受診時に医師・看護師・薬剤師に伝えてください。

その他の副作用

吐き気・嘔吐

症状

吐き気や嘔吐が起こる場合があります。

対処方法

軽い症状ではない場合はすぐに医師に相談してください。 肝機能障害などの重大な副作用の可能性があります。



味覚異常

症状

味を感じにくい、嫌な味がする、食べ物の味が変わった、食事がおいしくなくなったなどの症状があらわれる場合があります。

対処方法

食欲がなくなった場合などは、医師に相談しましょう。

発疹

症状

体、顔、頭などの皮膚に、ピリピリする、かゆい、熱を持っている、赤い発疹(ブツブツ)があらわれる場合があります。


対処方法

- 乾燥を避けるために皮膚の保湿を心掛け、刺激や洗浄力の強い石鹸などを使わないようにしましょう。
- 症状がひどくなる前に医師に相談しましょう。広範囲に症状がある場合はすぐ に治療が必要です。
 - 症状の程度や状況を「服用ダイアリー」に記録しておき、 受診時に医師・看護師・薬剤師に伝えてください。
 - 症状が気になる場合は、我慢せず、早めに相談してください。

MEMO

ヴァイトラックビ®の服用を始めた日から、 服用状況や体調などをチェックして、毎日忘れずにダイ アリーに記録しましょう。

気になる症状があった場合は、ダイアリーに記載して、必ず医師、看護師、薬剤師にご相談ください。



服用	開始日	4	年	月	⊟(曜日)							(服用	週目]
	(曜日)	/	/	,	/	/	/	/	/	,	/		/		/
וינם	(唯口)	()	()	()	()	()	()	()
180	の服用タイミング	10目	2回目	10目	2回目	10目	2回目	10目	2回目	108	2回目	108	2回目	10目	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診	BICO		*		•		•				•		•		
体温	1		°C												
体重			kg												
全	めまい														
全身の症状	体がだるい さむけ・発熱														
症	むくみ														
状	体重増加														
沿	食欲がない														
消化器の症状	便秘														
器の	下痢														
症	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
の運	手足のしびれや痛み														
の運 症動 状機 能	手足の動きがぎこちない														
状機	上手く歩けない														
HE	מאי נייו עמ														
	頭痛														
2	もの忘れ														
し他	動悸・息切れ														
0	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
1/1	あおあざができる														
	発疹														
あら	こなる症状が いわれた場合は、 対してください														

-			l l		l l			,
-	1	2	1	2	1	2		
	1	2	1	2	1	2		ヴァイ
		•		•		•		ワァイトラックビ。の服用について
°C		°C		°C		°C		う ビ
kg		kg		kg		kg		の服
							_	
							-	
							1	
								服
							_	用ダイ
								服用ダイアリー
							J	
							25	

服用開始日	年	月 日(曜日)			[服用 週目]]
	/	/	/	/	/	/	/	

		/		/		,	/	,	/		/	/		/	
日代	力(曜日)	()	()	()	()	()	()	()
18	の服用タイミング	108	20目	10目	20目	108	20目	10目	20目	108	20目	108	20目	108	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受記	9日に〇														
体流			°C												
体重	Ē		kg												
\$	めまい														
全身の症状	体がだるい														
の症	さむけ・発熱														
猴	むくみ														
	体重増加														
消	食欲がない														
消化器の症状	便秘														
0	下痢														
1	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
の運	手足のしびれや痛み														
証動	手足の動きがぎこちない														
能	手足のしびれや痛み 手足の動きがぎこちない 上手く歩けない 筋肉痛														
	頭痛														
	もの忘れ														
その	動悸・息切れ														
その他の症状	のどの痛み														
の症	出血が止まりにくい														
状	あおあざができる														
	発疹														
あ	になる症状が らわれた場合は、 載してください														

服戶	月開始日	4	年	月	⊟(曜日)							[服用	週目]
			/		/		/	,	/		/		/		
日付	(曜日)	()	()	(')	()	()	()	()
18	の服用タイミング	10目	20目	108	20目	108	2回目	10目	2回目	1 回 目	20目	108	2回目	108	2回目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受記	》 自にO		:		:		:		:		:		:		:
体》	3		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C
体重	Ē		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg
	めまい				0										
全	体がだるい														
全身の症状	さむけ・発熱														
症	むくみ														
1	体重増加														
3 水	食欲がない														
混	便秘														
器	下痢														
消化器の症状	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
₩.	プロのしまだれいたま れ														
近重	手足の動きがぎこちない														
状機	手足のしひれや痛み 手足の動きがぎこちない 上手く歩けない 筋肉痛														
育	筋肉痛														
	頭痛														
2															
その他の	動悸・息切れ														
他の	のどの痛み														
症	出血が止まりにくい														
状	出血が止まりにくい あおあざができる														
	発疹														
あ	こなる症状が らわれた場合は、 載してください														

服月	月開始日	:	年	月	⊟(曜日)								服用	週目]
			/		/	,	/		/		/		/		/
日付	(曜日)	()	()	()	()	()	()	()
18	の服用タイミング	10目	20目	108	20目	108	2回目	108	2回目	108	2回目	108	20目	108	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受討			:		:		:		:		:		:		:
体温	3		°C												
体重	<u> </u>		kg												
	めまい														
全	体がだるい														
全身の症状	さむけ・発熱														
症	むくみ														
17	体重増加														
5年	食欲がない														
化	便秘														
消化器の症状	下痢														
症	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
- VE															
が連症動	手足のしびれや痛み 手足の動きがぎこちない 上手く歩けない 筋肉痛														
状機	上手く歩けない														
前	筋肉痛														
	頭痛														
2															
0	動悸・息切れ														
他	のどの痛み														
症	出血が止まりにくい														
状	もの忘れ 動悸・息切れ のどの痛み 出血が止まりにくい あおあざができる														
	発疹														
あり	こなる症状が らわれた場合は、 哉してください														

п	1	ì
		١
У	4	á
	=	i
,	1	ı
	7	
ĸ	٥	۲
	2	
	J	7
×	4	ı
×	-	
	ı	ľ
	2	
	١	
	4	Į
	F	4
	ı	ı
	ı	J

服用	開始日	4	年	月	⊟(曜日)							(服用	週目〕
			/	,	/	,	/	,	′		/		/		/
日付	(曜日)	()	()	()	()	()	()	()
180	の服用タイミング	10目	2回目	108	2回目	10目	2回目	10目	2回目	108	20目	108	2回目	108	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診	BICO		•		:		:				:		:		·
体温			°C												
体重	i		kg												
14.7	めまい		N 5		N8				^8		N8		N 5		
全	体がだるい														
全身の症状	さむけ・発熱														
症	むくみ														
1/	体重増加														
当	食欲がない														
化	便秘														
消化器の症状	下痢														
症	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
の運	手足のしびれや痛み														
症動	手足の動きがぎこちない														
の運 症動 状機 能	上手く歩けない														
制定	筋肉痛														
	頭痛														
そ	もの忘れ														
その他の症状	動悸・息切れ														
の	のどの痛み														
症	出血が止まりにくい														
1/	あおあざができる														
	発疹														
あら	こなる症状が らわれた場合は、 成してください														

服用	用開始日		年	月	⊟(曜日)							[服用	週目]
			/		/	,	/	,	/		/		/		
日作	け(曜日)	()	()	()	()	()	()	()
18	の服用タイミング	108	20目	108	20目	108	2回目	10目	20目	108	2回目	108	20目	108	2回目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
旧服	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
用量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
四:	今日に〇		:		:		:				:		:		<u>:</u>
体》			°C												
体			kg												
숲	めまい														
全身の症状	体がだるい さむけ・発熱														
症	むくみ														
状	体重増加														
消	食欲がない														
化	便秘														
消化器の症状	下痢														
症状	吐き気・嘔吐														
	味覚異常														
の過	手足のしびれや痛み 手足の動きがぎこちない 上手く歩けない 筋肉痛														
	上手く歩けない														
削削	筋肉痛														
	頭痛														
7	もの忘れ														
l o	動悸・息切れ														
他の	のどの痛み														
その他の症状	出血が止まりにくい														
1/	あおあざができる														
	発疹														
あ	になる症状が らわれた場合は、 載してください														

服用]開始日	4	年	月	⊟(曜日)							[服用	週目]
		,	/		/		/		/		/		/		/
日付	(曜日)	()	()	()	(')	()	()	()
180	の服用タイミング	10目	20目	108	2回目	10目	2回目	10目	2回目	108	2回目	108	2回目	108	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診	日に〇														
体温	3		°C												
体重	i		kg												
	めまい														
全	体がだるい														
タの	さむけ・発熱														
全身の症状	むくみ														
1/	体重増加														
当	食欲がない														
消化器の症状	便秘														
器の	下痢														
症	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
の 活	手足のしびれや痛み														
症動	手足の動きがぎこちない														
の 症動 状機 能	上手く歩けない														
用它	筋肉痛														
	頭痛														
マ	もの忘れ														
その他の症状	動悸・息切れ														
他の	のどの痛み														
症	出血が止まりにくい														
水	あおあざができる														
	発疹														
あら	になる症状が らわれた場合は、 成してください														

服用	開始日	4	年	月	⊟(曜日)							(服用	週目]
	(曜日)	/	/	,	/	/	/	/	/	,	/	,	/		/
וינם	(唯口)	()	()	()	()	()	()	()
180	の服用タイミング	10目	2回目	10目	2回目	10目	2回目	10目	2回目	108	2回目	108	2回目	10目	20目
1	カプセル25mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回服用量	カプセル100mg (個)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
量	内用液 (mL)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
受診	BICO		*		•		•				•		•		
体温	1		°C												
体重			kg												
全	めまい														
全身の症状	体がだるい さむけ・発熱														
症	むくみ														
状	体重増加														
沿	食欲がない														
消化器の症状	便秘														
器の	下痢														
症	吐き気・嘔吐														
状	味覚異常														
の運	手足のしびれや痛み														
の運 症動 状機 能	手足の動きがぎこちない														
状機	上手く歩けない														
HE	מאי נייו עמ														
	頭痛														
2	もの忘れ														
し他	動悸・息切れ														
0	のどの痛み														
	出血が止まりにくい														
1/1	あおあざができる														
	発疹														
あら	こなる症状が いわれた場合は、 対してください														

Personal Data

本人

名	前			電	話		
住	所						
生年	月日	年	月		В	血液型	<u></u>
アレル	ギー						
据 田	丁	ヴァイトラックビ®.					

治療を受けている病院

病	院	名	
電		話	
医		師	
診察券番号		影号	

緊急連絡先(家族など)

名	前	続	柄
住	所		
電	話		

この手帳は、私にとって大切なものです。拾われた方は、上記にご連絡をお願いします。 また、私の体調がすぐれず、話が出来ないようでしたら上記の病院または緊急連絡先に ご連絡をお願いします。



製造販売元 [文献請求先及び問い合わせ先]

バイエル薬品株式会社

大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001 https://pharma.bayer.jp

[コンタクトセンター] 0120-106-398 <受付時間> 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く) 。
ちまいフン用組含。コケペライトででおば らけしでもよいな来出が話。ちかかもが観めのほ 。いちが入し数さるイーへのこコ員利息技

7===
D-0.4
2.1

7ー代共絡重 豪深

空争

●治療を受けている医療機関

X

切り取っ

てご活用い

いただけます →

医療機関名								
電 話								
担 当 医								
診察券番号								
●馭台:南紋生(完体かじ)								

氏名 ______ 電話 _____

PP-VIT-JP-0006-15-02

救急隊員および救急外来担当の先生へ

このカードを携帯している患者さんは、抗悪性腫瘍剤ヴァイトラックビ®による治療を受けています。

注意を要する副作用として、次のような症状が発現することがあります。 症状がみられた場合には、適切な医療機関での処置と担当医への連絡 をお願いします。

注意を要する副作用と主な症状

■中枢神経系障害

浮動性めまい、錯感覚、歩行障害、運動失調、認知障害

■肝機能障害

ALT增加、AST增加

■ 骨髓抑制

好中球減少、白血球減少、貧血、血小板減少、リンパ球減少

氏 名	
生年月日	血液型型
アレルギー	
服 用 薬 <u>ヴァイトラックビ®</u>	

く切り取ってご活用いただけます

